

Pessoas em condições clínicas especiais:

- Pessoas com exame HIV positivo, assintomáticas e que apresentem o LT-CD4 maior ou igual a 350 células/mm³.
- Pessoas com três meses ou mais de término de quimioterapia venosa ou oral e sem previsão de novo ciclo
- Pessoas com pelo menos seis meses de interrupção de uso de medicamento anti-célula B e Fludarabina
- Pessoas que se submeteram a transplante de células-tronco hematopoiéticas há pelo menos 24 meses e que não estejam fazendo uso de imunossupressor (se não houver doença do enxerto vs. hospedeiro ou recaída da doença de base)
- Pessoas com síndrome mieloproliferativa crônica que apresentem padrão laboratorial estável e neutrófilos acima de 1.500 células/mm³
- Pessoas com síndrome linfoproliferativa que terminaram tratamento de quimioterapia há pelo menos três meses (no caso da utilização de medicamento anti-células B, o intervalo deve ser de seis meses)
- Pacientes hemofílicos e com doenças hemorrágicas hereditárias
- Pacientes com doença falciforme
- Pessoas que fazem uso contínuo de ácido acetil-salicílico (AAS)
- Pessoas com alergia a ovos e derivados ou a algum componente da vacina (devem ser encaminhadas a centros de referência para vacinação especial)